



## Jaarkalender / Bedrijfsgezondheidsplan Schapen:

Deze jaarkalender bevat een beknopt overzicht met aandachtspunten waar u per maand rekening mee kunt houden. Algemeen is het advies om zoveel mogelijk bevindingen / behandelingen op te schrijven en daarbij de datum te noteren. Mochten er problemen optreden dan kunnen wij aan de hand van deze informatie het beste advies geven. Voor specifieke informatie neemt u contact op: **0595-441706**

### 1. Januari

**Voeding:** Houd de graskwaliteit en de conditie van de dieren nauwgezet in de gaten. Eventueel kunt u de schapen laten scannen op meerlingdrachten. Guste (niet drachtige) dieren kunt u nu nog vroegtijdig afvoeren.

**Vaccinaties:**

- Enterotoxinemie (“het Bloed”)
- Zomerlongontsteking

Heptavac P<sup>®</sup> biedt bescherming tegen beide ziekten en Covexin 10<sup>®</sup> alleen tegen “het Bloed”.

### 2. Februari

**Voeding:** Begin met het bijvoeren van krachtvoer op het moment dat de dieren in conditie achteruitgaan of op 4 weken voor de verwachte aflamdatum.

**Opstallen en evt. scheren:** Vermijd zoveel mogelijk stress rondom het opstallen, laat de rantsoenverandering geleidelijk verlopen en let op verworpen vruchten als gevolg van stress.

**Vaccinaties:**

- Ecthyma → Ecthybel<sup>®</sup>

### 3. Maart

**Voeding:** Zorg ervoor dat de schapen voldoende energie binnenkrijgen. De lammeren groeien nu het hardst en de biestproductie komt ook op gang.

**Aflammeren:** Ontwikkeling uier, ontsmetten naveltjes van de lammeren en het geboortegewicht van de lammeren registreren. Dit laatste zegt iets over uw voerschema en/of de biest- en melkvoorziening goed is.

**Dierziekten:**

Wormen: om een vroege besmetting van de weide te voorkomen werden in het verleden altijd alle schapen voor het naar buiten gaan ontwormd. Inmiddels weten wij dat dit onnodig is en resistentie in de hand werkt. Ons advies is om enkele oudere schapen met een eenling niet te ontwormen, zodat er een lichte besmetting op de weide afgezet wordt en de lammeren op deze manier weerstand op kunnen bouwen.

### 4. April

**Voeding:** De ooien en lammeren gaan naar buiten: hierop moet de voeding aangepast worden. De krachtvoergift kan geleidelijk afgebouwd worden. Let op de magnesiumvoorziening (kopziekte) wanneer u helemaal geen krachtvoer meer verstrekt! De lammeren mogen in eerste instantie nog onbepaald gevoerd worden en dit kan later afhankelijk van de kwaliteit van het weidegras ook afgebouwd worden.

**Vaccinaties:** Lammeren kunnen vanaf 3 weken leeftijd gevaccineerd worden tegen Het bloed & Zomerlongontsteking (Heptavac P®). Deze vaccinatie moet na 4–6 weken herhaald worden.

#### **Dierziekten:**

Coccidiose: lammeren zijn vatbaar voor coccidiose tussen 3–12 weken leeftijd. Indien de dieren dun op de mest worden is het aan te raden om een mestmonster in te leveren om te kijken of coccidiose een rol speelt.

Maagdarmwormen: Het meest beducht zijn we voor de voorjaarsworm *Nematodirus battus*, de verschijnselen zijn dunne mest en dorst bij de lammeren. Het is moeilijk om deze van coccidiose te onderscheiden. Mestonderzoek is altijd verstandig om te doen alvorens te behandelen.

#### Algemeen maagdarmwormen:

het verdient de aanbeveling om ieder jaar een goed ontwormplan op te stellen dat bestaat uit: een beweidschema, mestonderzoek en een ontwormplan. Om de besmetting in een koppel gedurende het jaar te volgen bieden wij een **mestabonnement** aan. Gedurende het jaar wordt de mest van de lammeren 7x onderzocht en krijgt u specifiek advies over uw koppel, of u moet ontwormen of dat ontwormen juist helemaal niet nodig is.

### **5. Mei**

**Voeding:** Denkt u aan de cobalt voorziening van uw lammeren? Het beste is om de weide van cobalt te voorzien. Een ander spoedoplossing is door de lammeren met Biodyl te spuiten. Onderzoek heeft uitgewezen dat oraal Cobalt drenchen onvoldoende werkt.

#### **Dierziekten:**

Maagdarmwormen: Blijvend aandachtspunt. Probeer zo lang mogelijk met mestonderzoek en omweiden de besmetting laag te houden, zodat er geen ontworming hoeft plaats te vinden.

### **6. Juni**

**Voeding:** Bijna alle weides zijn van voldoende goede kwaliteit. Let goed op de groei van de lammeren. Bijvoeren kan verminderde groei compenseren. Pas wel op dat de mest door het rijke voer niet te dun wordt.

#### **Dierziekten:**

- Diarree als gevolg van te rijke voeding, wormen en/of coccidiose
- Maagdarmwormen: pas op voor *Haemonchosa* (rode lebmaagworm) en laat bij twijfel mestonderzoek uitvoeren.
- Myasis: controleer dagelijks de schapen en stel een plan van aanpak op. Scheer evt. de oaien, zodat de vliegen minder gemakkelijk eitjes leggen. Behandel tijdig met bijvoorbeeld Clik (aan het begin van het seizoen) of Neocidol!

### **7. Juli**

**Voeding:** Lammeren spenen: Voorafgaand aan het spenen is het verstandig om de oaien al iets soberder te voeren, zodat het opdrogen van de uier goed kan verlopen. Om lammeren goed te kunnen spenen moeten ze bij voorkeur tussen de 15–20% van het volwassen gewicht bereikt hebben (13–17 kg). Na het spenen moeten de lammeren voldoende smakelijk voer op kunnen nemen en mogen de moederschapen niet zien. Weid de oaien op een schrale weide, zodat ze voldoende goed opdrogen.

#### **Dierziekten:**

- Myasis: Scheer de oaien preventief en/of behandel tijdig!
- Zwoegerziektebestrijding: neem bloed af voor onderzoek op zwoegerziekte

## 8. Augustus

### Voeding:

- Conditie: Ooien met een te ruime conditie (>3,5) kunnen nu nog iets schraler geweid worden.
- Groei lammeren: Controleer de groei van de foklammeren, zodat ze op het moment dat ze bij de ram moeten 60% van hun volwassen gewicht hebben (ongeveer 50 kg).

### Selectie ooien en ram:

- Lijfbieders
- Zwoeger
- Uierontsteking
- Vruchtbaarheid
- Klauwgezondheid

**Quarantaine:** Plaats de aangekochte ram (of andere dieren) minimaal 14 dagen in quarantaine i.v.m. verschillende dierziekten. Bekijk de klauwtjes (rotkreupel) en ontworm indien nodig.

**Vaccinaties:** Chlamydomphila abortus: (Enzovax® → 4 maanden – 4 weken tot dekken).

## 9. September

**Voeding:** Conditie score: De ooien behoren nu een conditiescore te hebben van 3–3,5

- Flushen: Houd de ooien eerst in een “schralere” weide. Verweid ze vervolgens 2 weken voordat de ram erbij komt naar een “rijke” weide. Op deze manier kun je het aantal lammeren per schaap omhoog brengen.

**Dierziekten:** Leverbot: Wees bedacht op de acute vorm van leverbot en raadpleeg daartoe de Leverbot prognose van de GD. Is de prognose slecht dan is het verstandig om de schapen niet op “natte” percelen te weiden. Daarnaast kunt u de dierenarts raadplegen voor advies.

Maagdarmwormen: Wormbesmettingen kunnen zeker een rol spelen. Raadpleeg uw ontwormplan, doe mestonderzoek en behandel indien nodig.

Bekappen: De dieren kunnen nu voordat de ram erbij komt bekapt worden.

## 10. Oktober

**Voeding:** Conditie score: Houd de dieren op een conditie van 3–3,5. Vervetten mag niet, maar vermageren ook zeker niet.

### Vruchtbaarheid:

- Oestrussynchronisatie: kan een oplossing zijn om het lammer seizoen te verkorten.
- Ram eerst naast en later bij de koppel laten
- Noteren (her)dekkingen

## 11. November

**Voeding:** vergelijkbaar met oktober

### Vruchtbaarheid:

- Op tijd verwijderen van de ram om het lammer seizoen niet te lang te laten duren

## 12. December

**Voeding:** Denk aan het bijvoeren bij slechte weersomstandigheden. Zachte/vochtige winter: denk aan de vitamine D voorziening i.v.m. stijve overhouders.

### Dierziekten:

Leverbot: Voor dieren die eerder of nu nog op percelen hebben gelopen waar leverbot voorkomt is dit vaak het tijdstip om tegen leverbot te behandelen.

## **Ontwormplan:**

### **Basisregels:**

- De schapen met lammeren in het voorjaar uitscharen op de weide waar in de herfst de schapen het eerst vanaf zijn gehaald
- 95% van de ooien na het aflammeren ontwormen, dus schoon de weide in. De overige 5% (sterke ooien met bij voorkeur maar 1 lam) zorgen voor een lichte besmetting van de weide met wormen die gevoelig blijven voor het gebruikte ontwormmiddel. Op deze manier wordt resistentieontwikkeling tegengegaan.
- Omweiden naar percelen waar 3 maanden geen schapen hebben gelopen (dan is de weide pas weer echt schoon)
- Mei t/m september: iedere 2 weken omweiden
- Overige maanden: iedere 3 weken
- DOE MESTONDERZOEK: U kunt zich aanmelden voor het mestabonnement. Dit houdt in dat u 7x per jaar mest kunt inleveren van u lammeren en/of schapen. Hierbij doen wij een eitelling en geven bijbehorend advies over het al dan niet ontwormen. Ook kunt u met mestonderzoek nagaan of de ingezette ontworming zijn/haar werk heeft gedaan.
- Voor mestonderzoek neemt u verse mest van minimaal 5–10 dieren afhankelijk van de grootte van de koppel. Maak onderscheid in schapen en lammeren. Vermeld tegelijkertijd met het inleveren ook de locatie van de dieren, wanneer ze verweid zijn, of ze recent ontwormd zijn en zo ja, waarmee. Met al deze informatie proberen wij u van een zo goed mogelijk advies te voorzien.